



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

“Eficacia del manejo sindrómico para el tratamiento de infección de transmisión sexual en mujeres Centro de Salud San Fernando 2012 - 2013”

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Emily Mariel DÍAZ PINO

ASESORES

Dr. Erasmo HUERTAS TECCHINO

Mg. Oscar Fausto MUNARES GARCÍA

Lima, Perú

2013

“EFICACIA DEL MANEJO SINDRÓMICO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUJERES” CENTRO DE SALUD San Fernando 2012 – 2013

OBJETIVO: Identificar la eficacia del manejo sintomático de las Infecciones de Transmisión Sexual curables más comunes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio Descriptivo, Retrospectivo, Transversal. Conformada por 51 usuarias que acudieron al Centro de Salud San Fernando entre octubre 2012 a marzo 2013. Se utilizaron los métodos observacional y encuesta. Se seleccionó la población mediante las hojas de registro de atenciones e historias clínicas. Se realizó el registro de cada usuaria con sus características generales, reproductivas para posteriormente realizar el seguimiento domiciliario en el cual se verificó el cumplimiento del tratamiento, síntomas, signos, escala de riesgo reproductivo y resultado final (paciente curada o paciente no curada). De esta manera se verificó la eficacia para cada manejo sintomático.

RESULTADOS: El diagnóstico pre-manejo sintomático fue síndrome flujo vaginal con 27 usuarias (52.9%) y síndrome dolor abdominal bajo con 24 usuarias (47.1%). Solo el 56.9% de las parejas recibieron tratamiento. Como resultado del tratamiento con manejo sintomático tenemos que 33 mujeres (64.7%) fueron no curadas y están infectadas nuevamente con algún síndrome. La eficacia global para el manejo sintomático de las infecciones de transmisión más comunes del centro de salud San Fernando fue de 35%, mientras que la eficacia del manejo sintomático para el síndrome de flujo vaginal y síndrome dolor abdominal bajo fue de 37% y 33% respectivamente.

CONCLUSIONES: La eficacia del manejo sintomático no fue óptima tanto para el manejo sintomático del flujo vaginal como el Dolor abdominal Bajo en la población de estudio perteneciente al C.S San Fernando, sin embargo esto pudo deberse al hecho que 43.1% de las parejas no recibieron tratamiento para la Infecciones de Transmisión Sexual.

PALABRAS CLAVES: Infecciones de transmisión sexual, eficacia, Manejo sintomático.